

Exercice I

Soit $f \in \mathcal{L}(\mathbb{R}^3)$ et M la matrice de f dans la base canonique. On suppose que $M^3 = -M$.

- 1) Soit $y \in \text{Im}(f)$. Calculer $f^2(y)$.
- 2) Soit g l'endomorphisme de $\text{Im}(f)$ induit par f . Calculer g^2 . En déduire que $\text{rg}(f)$ est pair. On pourra considérer $\det(g)$.
- 3) On suppose que $M \neq 0$. Montrer que M est semblable à $\begin{pmatrix} 0 & -1 & 0 \\ 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$.

Exercice II

Soit $a \in]0, 1[$ et b un réel strictement positif. Soit g une fonction définie sur \mathbb{R} , 1 périodique et continue. On considère W la fonction définie sur \mathbb{R} par

$$W : x \mapsto \sum_{n=0}^{+\infty} a^n g(b^n x)$$

- 1) a) Justifier (proprement) que g est bornée.
 b) Montrer que la fonction W est bien définie sur \mathbb{R} .
 c) Montrer que W est continue et bornée. On majorera $\|W\|_\infty$ en fonction de $\|g\|_\infty$.
- 2) Soit f une fonction de \mathbb{R} dans \mathbb{R} , on pose $T(f)$ la fonction de \mathbb{R} dans \mathbb{R} définie par

$$T(f) : x \mapsto af(bx)$$

- a) Montrer que $T : f \mapsto T(f)$ est un endomorphisme de l'espace vectoriel des fonctions bornées de \mathbb{R} dans \mathbb{R} .
- b) Montrer que 1 n'est pas une valeur propre de T .
- c) Montrer que $T(W) = W - g$. Montrer de plus que W est l'unique fonction bornée vérifiant cette relation.
- 3) Dans la suite du problème on pose $g : x \mapsto \sin(2\pi x)$ et on suppose que b est un entier pair tel que $ab > 1$. On souhaite démontrer que, moyennant une hypothèse supplémentaire, W n'est dérivable nulle part.

On fixe x_0 un réel.

- a) Montrer que si f est une fonction de \mathbb{R} dans \mathbb{R} dérivable en x_0 et que si $(\alpha_m), (\beta_m)$ sont deux suites convergeant vers x_0 telle que pour tout entier m , $\alpha_m \leq x_0 \leq \beta_m$ et $\alpha_m < \beta_m$ alors

$$\lim_{m \rightarrow +\infty} \frac{f(\beta_m) - f(\alpha_m)}{\beta_m - \alpha_m} = f'(x_0)$$

- b) Justifier que pour tout entier m il existe un entier k_m tel que $b^m x_0 - k_m$ appartienne à l'intervalle $] -\frac{1}{2}, \frac{1}{2}]$.

Dans la suite du devoir on pose $\alpha_m = \frac{4k_m - 3}{4b^m}$ et $\beta_m = \frac{4k_m + 3}{4b^m}$

- c) Rappeler la formule de $\sin p - \sin q$ et montrer que pour tous réels x et y , $|\sin x - \sin y| \leq |x - y|$.
 En déduire que

$$\left| \sum_{n=0}^{m-1} a^n \frac{g(b^n \beta_m) - g(b^n \alpha_m)}{\beta_m - \alpha_m} \right| \leq (2\pi) \sum_{n=0}^{m-1} (ab)^n$$

- d) Calculer $g(b^m \alpha_m), g(b^m \beta_m)$. Montrer que pour $n > m$, $g(b^n \alpha_m) = g(b^n \beta_m) = 0$.
- e) Montrer que

$$\frac{W(\beta_m) - W(\alpha_m)}{\beta_m - \alpha_m} \leq \left(\frac{2\pi}{ab - 1} - \frac{4}{3} \right) (ab)^m$$

- f) En déduire que si $ab > 1 + \frac{3}{2}\pi$ la fonction W n'est pas dérivable en x_0 . Conclure.