

## Problème de Dirichlet

Si  $A$  est une partie d'un espace vectoriel de dimension finie sur  $\mathbb{R}$  ou sur  $\mathbb{C}$ , on note  $\mathcal{C}(A)$  le  $\mathbb{C}$ -espace vectoriel des applications continues de  $A$  dans  $\mathbb{C}$ . Les notations  $D$ ,  $\bar{D}$  et  $T$  désignent respectivement

- le disque ouvert  $D = \{z \in \mathbb{C}; |z| < 1\}$
- le disque fermé  $\bar{D} = \{z \in \mathbb{C}; |z| \leq 1\}$
- le cercle  $T = \{z \in \mathbb{C}; |z| = 1\}$ .

À une fonction  $f \in \mathcal{C}(T)$  quelconque on associe

- les coefficients de Fourier

$$c_n = \frac{1}{2\pi} \int_{-\pi}^{\pi} f(e^{it}) e^{-int} dt \quad (\forall n \in \mathbb{Z})$$

- la fonction  $g_f : D \rightarrow \mathbb{C}$  définie par la formule suivante, dont l'existence sera traitée dans la question 1 ):

$$g_f(z) = c_0 + \sum_{n=1}^{\infty} c_n z^n + \sum_{n=1}^{\infty} c_{-n} \bar{z}^n$$

où  $\bar{z}$  désigne le complexe conjugué de  $z$ ;

- la fonction  $G_f : \bar{D} \rightarrow \mathbb{C}$  définie par

$$G_f(z) = \begin{cases} f(z) & \text{si } z \in T \\ g_f(z) & \text{si } z \in D \end{cases}$$

Pour  $n \in \mathbb{N}$ , on note  $p_n$  et  $q_n$  les fonctions de  $\mathcal{C}(T)$  définies par

$$\begin{aligned} p_n(z) &= z^n \\ q_n(z) &= \bar{z}^n \end{aligned} \quad (\forall z \in T)$$

Soit  $X$  une partie non vide de  $\mathbb{C}$  et  $f$  une fonction bornée sur  $X$  on note

$$\|f\|_{\infty, X} = \text{Sup}_{z \in X} |f(z)|$$

On **admet** le théorème de Weierstrass trigonométrique :

**Théorème :** Soit  $\mathcal{P}(T)$  le sous espace vectoriel de  $\mathcal{C}(T)$  engendré par  $\{p_n; n \in \mathbb{N}\} \cup \{q_n; n \in \mathbb{N}\}$ . Toute fonction de  $\mathcal{C}(T)$  est limite uniforme d'une suite d'éléments de  $\mathcal{P}(T)$ .

*Le but du problème est de caractériser de différentes manières le prolongement  $G_f$  de  $f$  à  $\bar{D}$ .*

## A - Prolongement harmonique

Si  $U$  est un ouvert de  $\mathbb{C}$  on note  $\tilde{U} = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2; x + iy \in U\}$ . Pour toute fonction  $u : U \rightarrow \mathbb{C}$ , on note  $\tilde{u} : \tilde{U} \rightarrow \mathbb{C}$  la fonction définie par la formule  $\tilde{u}(x, y) = u(x + iy)$ . La fonction  $u$  est dite de classe  $\mathcal{C}^2$  si  $\tilde{u}$  est de classe  $\mathcal{C}^2$  au sens des fonctions de deux variables réelles. On note alors  $\Delta u$  la fonction définie sur  $U$  par

$$\Delta u(x + iy) = \frac{\partial^2 \tilde{u}}{\partial x^2}(x, y) + \frac{\partial^2 \tilde{u}}{\partial y^2}(x, y)$$

Dans cette partie, on fixe une fonction  $f \in \mathcal{C}(T)$  et on se propose de montrer que  $G_f$  est l'unique fonction  $G : \bar{D} \rightarrow \mathbb{C}$  qui vérifie les propriétés suivantes :

- (a1) la restriction de  $G$  à  $T$  coïncide avec  $f$ ;
- (a2)  $G$  est continue sur  $\bar{D}$ ;
- (a3) la restriction  $G$  à  $D$  est de classe  $\mathcal{C}^2$  et  $\Delta G(z) = 0$  pour tout  $z \in D$ .

On va d'abord montrer que  $G_f$  vérifie ces conditions. La condition (a1) est évidemment vérifiée.

- 1) Montrer que les deux séries qui entrent dans la définition de  $g_f(z)$  sont convergentes pour tout  $z \in D$ .

Soit  $S(z) = \sum_{n=0}^{\infty} a_n z^n$  la somme d'une série entière de rayon de convergence  $R$  supérieur ou égal à 1

- 2) Au moyen d'une dérivation terme à terme d'une série de fonctions de variable réelle, justifier que l'application  $\tilde{S} : \tilde{D} \rightarrow \mathbb{C}$  admet une dérivée partielle par rapport à  $x$  qui est continue sur  $\tilde{D}$ , et exprimer  $\frac{\partial \tilde{S}}{\partial x}(x, y)$  sous la forme de la somme d'une série.
- 3) Montrer que  $S$  est de classe  $\mathcal{C}^2$  sur  $D$  et déterminer  $\Delta S(z)$  pour tout  $z \in D$ .
- 4) En déduire que  $g_f$  est de classe  $\mathcal{C}^2$  sur  $D$  et que  $\Delta g_f(z) = 0$  pour tout  $z \in D$ .

On fixe  $z \in D$ , et on note  $P_z(t) = \operatorname{Re} \left( \frac{e^{it} + z}{e^{it} - z} \right)$  pour tout  $t \in \mathbb{R}$ .

- 5) En tenant compte de la définition des  $c_n$  dans l'expression de  $g_f(z)$ , montrer que

$$g_f(z) = \frac{1}{2\pi} \int_{-\pi}^{\pi} f(e^{it}) P_z(t) dt$$

- 6) Déterminer  $g_f$  pour  $f = p_n$  et  $f = q_n$ , où  $n \in \mathbb{N}$ . Donner la valeur de l'intégrale  $\frac{1}{2\pi} \int_{-\pi}^{\pi} P_z(t) dt$  et étudier le signe de  $P_z(t)$  pour tout  $t \in \mathbb{R}$ .
- 7) Montrer que si  $(f_n)_{n \in \mathbb{N}}$  est une suite d'éléments de  $\mathcal{C}(T)$  qui converge uniformément vers  $f$  sur  $T$ , alors  $G_{f_n}$  converge uniformément vers  $G_f$  sur  $\bar{D}$ .
- 8) Montrer que  $G_f$  est continue sur  $\bar{D}$ .

*On pourra utiliser le théorème admis dans le préambule.*

On se donne maintenant une fonction  $G$  vérifiant les conditions (a1), (a2) et (a3) et on se propose de démontrer que  $G = G_f$ .

- 9) On suppose dans cette question que  $f$  est la fonction nulle et que  $G$  est à valeurs réelles. Soit  $\varepsilon > 0$  et  $u : \bar{D} \rightarrow \mathbb{R}$  définie par  $u(z) = G(z) + \varepsilon |z|^2$ . Montrer que  $\Delta u(z) > 0$  pour tout  $z \in D$ . En déduire que  $u(z) \leq \varepsilon$  pour tout  $z \in \bar{D}$  (on pourra considérer, après en avoir justifié l'existence, un point  $z_0 \in \bar{D}$  où  $u$  atteint son maximum.)
- 10) Conclure dans le cas particulier de la question précédente, puis dans le cas général. (On pourra d'abord étendre la conclusion au cas où  $f$  est nulle mais  $G$  est à valeurs complexes.)

## B. Deux applications

*Première application.* On considère la fonction  $G$  définie sur  $\bar{D}$  par  $G(x + iy) = e^x \cos y$ .

11) Montrer que  $G$  vérifie la condition (a3) et en déduire, pour tout  $n \in \mathbb{Z}$ , la valeur de l'intégrale

$$\frac{1}{2\pi} \int_{-\pi}^{\pi} e^{\cos t} \cos(\sin t) \cos(nt) dt.$$

*Deuxième application.* Soit  $u : U \rightarrow \mathbb{C}$  une application continue définie sur un ouvert  $U$  de  $\mathbb{C}$ . Si  $a \in \mathbb{C}$  et  $R > 0$ , on note  $D(a, R) = \{z \in \mathbb{C}; |z - a| < R\}$  et  $\bar{D}(a, R) = \{z \in \mathbb{C}; |z - a| \leq R\}$ .

12) Montrer que  $u$  est de classe  $\mathcal{C}^2$  et telle que  $\Delta u = 0$  sur  $U$  si et seulement si, pour tout disque fermé  $\bar{D}(a, R)$  contenu dans  $U$  et pour tout  $z \in D(a, R)$ , on a

$$u(z) = \frac{1}{2\pi} \int_{-\pi}^{\pi} u(a + R.e^{it}) P_{\frac{z-a}{R}}(t) dt.$$

Pour  $n \in \mathbb{N}$ , on note  $u_n : U \rightarrow \mathbb{C}$  une fonction de classe  $\mathcal{C}^2$  telle que  $\Delta u_n = 0$  sur  $U$ .

13) Déduire de la question précédente que si la suite  $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$  converge uniformément vers une fonction  $u$ , alors  $u$  est également de classe  $\mathcal{C}^2$  et telle que  $\Delta u = 0$  sur  $U$ .

## C. Propriétés duales

Dans cette partie, on fixe  $z \in D$  et on considère l'application

$$\begin{aligned} \varphi_z : \mathcal{C}(T) &\longrightarrow \mathbb{C} \\ f &\longmapsto g_f(z) \end{aligned}$$

où  $\mathcal{C}(T)$  est muni de la norme  $\|\cdot\|_{\infty, T}$  définie en préambule.

Pour toute application  $\varphi : \mathcal{C}(T) \rightarrow \mathbb{C}$ , on considère les quatre propriétés suivantes :

- (c1)  $\varphi$  est une forme  $\mathbb{C}$ -linéaire et continue;
- (c2)  $\forall n \in \mathbb{N}, \varphi(p_n) = z^n$ ;
- (c3)  $\forall n \in \mathbb{N}, \varphi(q_n) = \bar{z}^n$ ;
- (c4)  $\forall f \in \mathcal{C}(T), |\varphi(f)| \leq \|f\|_{\infty, T}$ .

14) Montrer que  $\varphi_z$  vérifie ces quatre propriétés.

15) Montrer que si  $\varphi$  vérifie les conditions (c1), (c2) et (c3), alors  $\varphi = \varphi_z$ .

Dans la suite de cette partie, on se donne  $\varphi : \mathcal{C}(T) \rightarrow \mathbb{C}$  vérifiant les conditions (c1), (c2) et (c4), et on se propose de démontrer que  $\varphi = \varphi_z$ .

Dans les deux questions suivantes, on se donne  $\lambda \in \mathbb{R}$  et on considère une fonction  $f \in \mathcal{C}(T)$  à valeurs réelles positives ou nulles. Soit  $h \in \mathcal{C}(T)$  définie par la formule  $h(z) = 2f(z) - \|f\|_{\infty, T} + i\lambda$  pour tout  $z \in T$ .

- 16) Calculer  $\|h\|_{\infty, T}^2$  en fonction de  $\|f\|_{\infty, T}$  et de  $\lambda$ .
- 17) En étudiant  $|\varphi(h)|^2$ , montrer que  $\varphi(f) \in \mathbb{R}$  puis que  $\varphi(f) \geq 0$ .
- 18) En déduire que  $\varphi(\bar{f}) = \overline{\varphi(f)}$  pour tout  $f \in \mathcal{C}(T)$ , et conclure.